

Coptolabrus augustus subsp. Antaeus

(subsp. nova)

anterioribus

F. et G. Hauser.

C. austro subsp. **angulicollis** **G. H.** similis, sed multo maior, elytris opacis, prothorace minus angulatim dilatato.

Capite et prothorace violaceo-nigris, fronte et vertice fortiter punctato-rugulosis, fronte sulcisque frontalibus rufo-cupreis; Antennas ut in austro.

Prothorace medio fortiter subangulatim, raro angulatim vel fere rotundate dilatato, longitudine sua 1,1 latiore vel longitudinis latitudine, antrorsum rotundate angustato, retrorsum profunde sinuato, angulis anticis a capite paulum distantibus, obtusis, angulis posticis lobuliformibus, leviter retrorsum, fortiter extrorsum productis, declivibus, apice leviter obtusis, rufo-cupreo-fulgentibus; foveolis ante hos plerumque profundis, impressione transversa manifesta coniunctis; lateribus latius quam in austro typico explanatis, marginibus lateralibus antice et postice sat fortiter elevatis et crasse nigro-callosis, late et fortiter transversim rugulosis vel crenulatis, rufo-cupreo-fulgentibus (lumine a fronte incidente viridi-aureo-relucentibus), margine antico sinuato, nigro-callosi, intus angustissime rufo-cupreo, margine postico leviter arcuato, juxta lobulos posticos, sed nunquam medio, late rufo-cupreo; disco violaceo-nigro vel fere nigro, opaco vel subopaco, leviter convexo, subtilissime transversim longo-undulato-ruguloso (ut in angulicollis), linea media tenui, semper integra.

Coleopteris nigris, opacis, elongato-ellipticis (hand raro lateribus magis parallelis, humeris magis evolutis), latitudine in ♂ fere duplo, in ♀ 1,7—1,8 longioribus, plerumque valde convexis; limbo mediocriter lato, horizontaliter

explanato, antice leviter elevato, fortissime crenulato, aureo-smaragdino vel aureo, fulgidissimo, intus subtilissime rufo-cupreo marginato, sat longe ante apicem abrupto, deinde lateribus levissime sinuatis; mucrone longo, bicuspidato, crebre leviter sursum reflexo; tuberculis primariis per-magnis, nigris, nitidis, valde convexis et valde pro-minentibus (fere ut in *C. pustulifero*), subrotundis vel magis elongatis, sat numerosis (in serie prima 8—11), plerumque costulis manifestis (interdum fere obsoletis) coniunctis, nunquam granulis superficie confluentibus; tuberculis secundariis nigris, nitidis, perparvis sed plerumque bene evolutis, creberrimis, lineas flexuosas tubercula pri-maria sequentes vel fere rectas formantibus (interdum minimis, seriebus externis fere obsoletis); tuberculis tertiaris minutissimis sed plerumque perspicuis, lineas breves irregu-lares formantibus granulisque superficie irregulariter con-fusis; superficie subtilissime, sed sat confertim ruguloso-granulato.

Subtus niger, prothoracis episternis obsolete, sterno medio sat fortiter transversim rugulosis, sterno, mesothoracis episternis elytrorumque epipleuris plerumque violaceo-reluctibus, episternorum epipleuris postice, elytrorum epipleuris margine inferiore magis minusve purpureis, coxis anticis purpureo-cinctis.

Pedibus perlongis, sat fortibus, nigris, femoribus posticis in ♂ fere abdominis apicem attingentibus, tibiis paulo longioribus, tarsis tibiis paulo brevioribus, *tarsis anticas in ♂ minime, crebre haud dilatatis.*

Long. ♂ 44—52, ♀ 47—55 mm.

Lat. ♂ 27,5—32,5, ♀ 28,5—32,5 mm.

In montibus inter Chnae prov. Hunan et Quantung.

Haec subspecies *C. augusti* Bat. eadem ratione mutata est ut *C. coelestis* St. subsp. *giganteus* Born.